

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE


K
H
H
M
M
A
B
D
E
E
E
E
F
F
G
G
G

Observation d'un garcon qui pice par le nombile depuis sa naissance. il est agé de 4. ans et trois mois.

Il se nomme Jean Bap.te Joseph Campion, fils de Joseph et de Marie anne Joseph Cattelain, elle a eu trois Enfans, celui ci est son premier, elle ne connoit aucune cause qui ai pû produire cette variation de la nature. les deux autres sont très bien conformés. Cet Enfant vint au monde naturellement, la sage femme lui noua le cordon a l'ordinaire. au bout de 9. jours la ligature tomba, on s'apperçût dès les premiers jours de la naissance de cet Enfant que l'urine couloit continuellement par deux petits trous situés sur les côtés latteraux de la tumeur de l'ombeligue. à l'endroit marqué **A.** est la verge qui n'a pas plus de trois lignes du côté du rafé et 5. a 6. du côté de l'ombiligue. il me semble qu'il n'y a point de corps caverneux. **B.** la tête de la verge non perforée. **C.** le prépuce bien marqué, sur les côtés et en dehors superieurement entre la tumeur ombélicale, la verge est dépourvüe de prépuce. **D.** le filet ou freint est bien marqué en tirant le prépuce du côté du rafé. **E.** la tumeur ou descente du côté gauche. elle diminue beaucoup lorsque l'enfant a resté quelque tems au lit. elle repond aux doigts avec dureté quand on la touche, et sur tout lorsque l'enfant pleure. **F.** une autre petite

ARC 25 d. 147

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

tumeure dans l'aine droite, dans les inégalités de laquelle il m'a semblé reconnoître un testicule. **G.** le rafé. **H.** le tour de la tumeur ombélicale. **J.** chaque côté latterale de la tumeur sont les uretéres par où coulent continuellement les urines. **K.** la ligne blanche depuis l'ombelique (deux doigts au dessus de cet endroit) est comme une corde applanie et douloureuse en cette partie. **L.** en relevant la tumeur de l'ombelique vis-à-vis les deux ureteres et deux lignes au dessous on apperçoit, sous chaque uretere, une petite glande platte et grosse comme un gros pois, de couleur rouge comme la tumeur ombelicale: entre ces glandes et l'intervale de la verge on apperçoit nombre de petits trous imperceptibles. **M.** les deux stilets dans les deux uretéres. Celui du côté droit est entré avec aisance de près de 6. pouces. il y a lieu de croire que cet uretére descent du rein en ligne spirale, au lieu que le gauche, aiant conservé sa figure plus ordinaire en **S** capitale, n'a permis l'entrée du stilet que de 3 pouces. j'ai senti avec ma sonde du vuide dans chaque urétére plus qu'il ne doit y en avoir en pareil âge.

Ne seroit-il pas permis de croire que la tumeure ombélicale fut formée par le fond de la vessie attachée par l'ouraque ou arteres ombelicales qui ont servi a porter la nourriture de l'enfant lorsqu'il étoit renfermée dans la matrice et que ces differens ligamens ont soutenu la vessie dans cette situation. J'ai d'autant plus lieu de le croire qu'il semble

que la ligature des artères ombélicales ne
paroît n'avoir eu rien de Commun avec cette
tumeur; au Contraire de tour ces glandes L. on
apperçoit un demi cercle entre les pubis et la
tumeur ombelicale, qui s'enfonce du Côté du ventre
de plusieurs lignes!

Dans une variation de nature semblable,
l'enfant ne peut devoir sa vie qu'à l'ouverture
des uretères, latteralement ouverts au dehors
de cette tumeur. Si au contraire ils eussent, ainsi
que la vessie, descendus dans le bassin de
l'hypogastrique et que cette vessie eut été attachée
au rectum comme à l'os pubis par le moyen du
péritoine, ne seroit-il pas péri il y a longtêms
puisque l'urine se seroit épanchée dans le bas
ventre, pere et mere n'ayant jamais pensé que
la verge de leur enfant quoique mal conformée,
n'étoit point perforée?

Quoiqu'il y ait apparence que cet enfant ait
rendu continuellement ses urines avant que d'être
au monde, la mere ne se souvient pas d'avoir
avant ni après sa Couche, vuidé des eaux plus que
dans les autres. Durand chirurgien
major

A Arras le 7 aoust 1755.

ACADEMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHEQUE

No. 101.